



Възрастови групи	Завършен ваксинационен курс (първична имунизация)				Бустерна доза с адаптирана ваксина срещу Omicron BA.1	
	Първа доза	Втора доза	Вид ваксина	Интервал между двете дози (в седмици)	Бустер с Comirnaty Original/Omicron BA.1 или Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1	Интервал между завършен ваксинационен курс и бустер с адаптирана ваксина/интервал между поставена бустерна доза и бустерна доза с адаптирана ваксина
5-11 г. вкл. 6-11 г. вкл.	Comirnaty Spikevax	Comirnaty Spikevax	иРНК иРНК	≥ 3 ≥ 4	Не се поставя	-
12-17 г. вкл.	Comirnaty	Comirnaty	иРНК	≥ 3	Поставя се	≥ 3 месеца
	Spikevax	Spikevax	иРНК	≥ 4		
≥ 18 г.	Comirnaty	Comirnaty	иРНК	≥ 3	Поставя се	≥ 3 месеца
	Spikevax	Spikevax	иРНК	≥ 4		
	Vaxzevria	Vaxzevria	векторна	4-12		
	JCOVDEN	-	векторна	-		
	Vaxzevria	Comirnaty	Схема на хетероложна ваксинация	≥ 12		

* На лица със завършен ваксинационен курс, които са преболедували COVID-19, се препоръчва да отложат поставянето на бустерна доза с адаптирана ваксина с 3 месеца.

** На лица, които са тежко имунокомпрометирани (вкл. деца над 5 г.), трета (подсилваща) доза иРНК ваксина може да се приложи най-малко 28 дни след втората доза, по преценка на лекар.

*** Таблицата е изготвена съгласно препоръките на Експертния съвет по надзор на имунопрофилактиката и кратките характеристики на посочените ваксини срещу COVID-19.